



DR. D. GORLE
 DR. J. VAN HEVELE
 DR. V. LENAERTS
 DR. S. ONGENA
 DR. K. BERQUIN
 DR. K. HENDRICKX
 DR. G. ORYE

CENTRAAL
 SECRETARIAAT
 03 760 23 05



www.mkawaasland.be

AZ NIKOLAAS CAMPUS SINT-NIKLAAS MOERLANDSTRAAT 1
 AZ NIKOLAAS CAMPUS BEVEREN OUDE ZANDSTRAAT 99
 SINT-JOZEFKLINIEK BORNEM KASTEELSTRAAT 23



NARCODONTIE



MOND, KAAK EN
 AANGEZICHTSCHIRURGIE
WAASLAND

INLEIDING

Na overleg met uw tandarts is besloten om de tanden van uw zoon of dochter onder narcose te laten behandelen. In deze folder vindt u meer informatie over deze behandeling.

BEHANDELPLAN

Uw tandarts heeft u doorverwezen omdat hij/zij de behandeling niet kan uitvoeren in de stoel wegens een te uitgebreid behandelplan en de jonge leeftijd van uw kind. Tijdens de consultatie zal onze kindertandarts in de mond van uw zoon of dochter kijken en zal er besproken worden wat er precies moet gebeuren.

Operatie

Aan het begin van de operatie kan één van de ouders van de patiënt mee tot het kind slaapt. Wanneer het kind na de operatie in de ontwaakruimte toekomt, mag de ouder er opnieuw bij.

De tanden van de patiënt worden tijdens de behandeling gevuld met wit vulmateriaal en eventueel worden stalen kronen gebruikt bij uitgebreid tandbederf. Wanneer er tanden verwijderd worden tijdens de operatie, zal een verteerbare hechting worden gebruikt.

NA DE OPERATIE

Pijn

Indien er tijdens de behandeling geen tanden verwijderd werden zal uw zoon of dochter geen pijn ervaren. Wanneer er wel tanden verwijderd werden en de patiënt pijn heeft mag u Nurofen® siroop of Perdolan® siroop toedienen volgens het gewicht van uw kind.

Eten en drinken

Meteen na de ingreep is er in principe geen probleem om te eten of te drinken. Wanneer er tanden verwijderd werden en uw zoon of dochter toch last heeft, kan hij of zij zich best beperken tot zachte voeding. Geleidelijk aan zal de patiënt weer normaal kunnen eten.

Nabloeding

Wanneer er tijdens de ingreep een tand verwijderd werd, kan de wond tot 24 uur daarna nog bloed nasijpelen. Dit komt slechts beperkt voor.

Wanneer er toch nabloeding zou optreden kan u best volgende adviezen opvolgen:

- Neem een compressie of een schone zakdoek;
- Maak daarmee de mond schoon en droog;
- Neem een tweede compressie en vouw het dubbel;
- Leg dit opgevouwen compressie op de wonde;
- Houdt de tanden zo mogelijk een half uur stevig op elkaar geklemd.

VERDERE VERZORGING

Wanneer er tijdens de ingreep tanden verwijderd werden, mag de mond de dag van de ingreep niet gespoeld worden. Het is wel aan te raden voorzichtig de tanden te poetsen.

Na de behandeling is het niet nodig terug op de dienst MKA op controle te komen. Een controle bij de eigen tandarts volstaat.

PREVENTIE

Nog enkele adviezen voor een goede mondhygiëne:

- Streef bij uw kind naar 2 fluoridemomenten per dag. Dit door tweemaal per dag te poetsen:
 - o Tot 6 jaar met kindertandpasta (maximum 500ppm fluoride);
 - o Vanaf 6 jaar met gewone tandpasta (1000 tot 1500ppm fluoride);
- Beperk het aantal voedingsmomenten tot maximum 5 per dag inclusief tussendoortjes;
- 6-maandelijkse controle bij uw tandarts wordt sterk aangeraden;
- Vermijdt koolzuurhoudende dranken (bruiswater – frisdrank).