



DR. D. GORLE
 DR. J. VAN HEVELE
 DR. V. LENAERTS
 DR. S. ONGENA
 DR. K. BERQUIN
 DR. K. HENDRICKX
 DR. G. ORYE

CENTRAAL
 SECRETARIAAT
 03 760 23 05



www.mkawaasland.be

AZ NIKOLAAS CAMPUS SINT-NIKLAAS MOERLANDSTRAAT 1
 AZ NIKOLAAS CAMPUS BEVEREN OUDE ZANDSTRAAT 99
 SINT-JOZEFKLINIEK BORNEM KASTEELSTRAAT 23



TPD
 SARPE



MOND, KAAK EN
 AANGEZICHTSCHIRURGIE
 WAASLAND

INLEIDING

In overleg met uw kaakchirurg en orthodontist is er besloten over te gaan tot een chirurgische verbreding van de bovenkaak door middel van transpalatinale distractie (TPD). In deze folder krijgt u meer informatie over de behandeling.

BEHANDELPLAN

U werd door de orthodontist doorverwezen omdat een zuiver orthodontische behandeling niet volstaat. Tijdens het eerste gesprek met de kaakchirurg wordt u ingelicht in verband met de behandeling.

De orthodontist beslist of er gebruik gemaakt zal worden van een Sarpe- of een TPD-module. Een Sarpe wordt geplaatst door de orthodontist waarna de kaakchirurg zal overgaan tot verbreding van de bovenkaak. Een TPD-module wordt geplaatst door de kaakchirurg.

OPERATIE

Tijdens de operatie wordt de kaak verzwakt ter hoogte van de linker en rechter sinusholte, evenals de middellijn van de centrale snijtanden. De groeilijnen ter hoogte van de bovenkaak worden losgemaakt. De operatie vindt plaats onder narcose.

NA DE OPERATIE

Bij het ontwaken zal er bij u hoogstens een spleet van 1mm tussen de twee voorste snijtanden aanwezig zijn.

PIJN EN ZWELLING

De eerste week na de operatie kan u zich behelpen met pijnstilling.

Na de operatie zal de bovenkaak zwellen. De dag van de operatie is het zeer belangrijk de wangen koel te houden met cold packs om zwelling tegen te gaan. De eerste dagen na de operatie is het aan te raden lichtjes rechtop te slapen.

SNUITVERBOD

De eerste week na de operatie mag u de neus niet snuiten. Wanneer er bloed uit de neus zou komen, mag u dit zachtjes schoonvegen.

ETEN EN DRINKEN

Na de operatie is het belangrijk voldoende water te drinken. Dit kan u doen met kleine slokken. Uw dagelijkse voeding kan u aanvullen met calorierijke dranken zoals Fortimel® of Nutridrink®. Het is mogelijk dat u in de eerste dagen na de operatie toch wat gewicht verliest. Aanvankelijk start u met zachte voeding, na enkele dagen mag u overschakelen op halfzachte voeding. U kan best uw suikerconsumptie beperken om gaatjes in de tanden tegen te gaan.

MONDVERZORGING

Na de operatie dient u zo snel mogelijk de tanden poetsen met een zachte tandenborstel. Ook de TPD-module dient zachtjes gepoetst te worden.

DUUR VAN DE BEHANDELING

Opname

Bij deze operatie wordt u doorgaans één nacht opgenomen in het ziekenhuis.

Chirurgische fase

Na een week komt u voor het eerst terug op controle. Tijdens deze afspraak krijgt u informatie over hoe u zelf aan de TPD-module mag beginnen draaien. Dit moet vanaf dan dagelijks gebeuren en doet geen pijn. Na twee à drie weken draaien zal in samenspraak met de orthodontist beslist worden om de TPD-module te blokkeren. Op dat moment heeft u een spleet tussen de voorste snijtanden van enkele millimeters, waardoor het lijkt alsof er een tand ontbreekt.

Orthodontische behandeling

Ongeveer twee maanden na de operatie zal de orthodontist overgaan tot het plaatsen van een beugel. Vier maanden na het plaatsen van de TPD-module zal deze module weer verwijderd worden. Dit gebeurt onder lokale verdoving en hiervan zal u geen zwelling ervaren.

Na de behandeling

De TPD-behandeling zorgt enkel voor de verbreding van de bovenkaak. Indien blijkt dat de stand van de kaken tegenover elkaar niet correct is, kan later alsnog een kaakoperatie nodig zijn om de beet te corrigeren.